mediconsult Academy

Workshop OCT und Funduskamera

Michael Wyss

M.Sc. Optometrist FAAO

eyeness ag, Bern / Switzerland

mwyss@eyeness.ch

Programm

13:00 Theoretischer Teil I

- Businessmodell Optometrie
- Integration in die Praxis
- Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten SLO und OCT
- Interpretation der Aufnahmen
- Kommunikation mit Fachpersonen

14:30 Kaffee-Pause

15:00 Theoretischer Teil II

- Fallbeispiele aus der Praxis

16:30 – 17:30 Praktischer Teil

- Hands-On Übungen an beiden Gerätetypen (SLO / OCT)

Offenlegung

Keine kommerziellen oder persönlichen Interessen
oder Konflikte mit irgend einem Produkt oder einer
Firma welche in diesem Vortrag erwähnt wird.

Eyeness AG ist oder wurde als Berater, Entwickler oder Referent unterstützt von (in alphabetischer Folge):

ALCON AG Vision Care

BAUSCH & LOMB Inc.

BOSTON Polymer Technology

CIBA Vision

COOPER Vision Inc.

DEBRA International

FALCO Linsen AG

HAAG-STREIT Diagnostics

GELFLEX Laboratories

JOHNSON & JOHNSON Vision Care

LHW FOUNDATION

MEDICONSULT AG

New England College of Optometry NECO

SENSIMED SA

Swiss Academy of Ophthalmology

RaayonNova

TECHCOLORS / Adventures in Colors

TISSOT Medical Research SA

Universitätsspital Basel USB

VIVIOR AG

Versprechen Augenoptik

- Brillenglasbestimmung mit dem Ziel der perfekten optischen Lösung für den Kunden
 - äusserst exakt, schnell, entspannt, **kostenlos**

PasKal 3D

Mit Apple TV und Kino-Effekt zur perfekten Gleitsichtbrille

Gesundheits-Optiker

TELEMEDICINE MADE EASY WITH NEXY!

New advancements in innovative diagnostic devices and telecommunication technology have made it possible to utilize telemedicine as a platform to improve access to quality healthcare.

Teleophthalmology is a branch of telemedicine

and plays a major role in prevention of blindness and identification and control of major chronic diseases, such as: diabetes, hypertension, cardiovascular disease, some types of cancers and more.

STEP 1

Patient visits an healthcare provider, such as Optometrist, Primary Care, Mobile clinic or Hospital.

STEP 2

Nexy automatically captures retinal photos. No dilation is required.

STEP 3

Data is uploaded from the Nexy tablet on a secure cloud-based server.

STEP 4

Licensed specialist evaluates and interprets the results.

TELEMEDICINE PLATFORM INCLUDED

Nexy receives the results directly on the tablet.

Results are sent back to the cloud based server.

Zitat Optik Tim Findeisen, Leipzig:
„Die Augenhintergrundanalyse
ist mein **USP**“

„Ich hafter nicht für die Auswertung.
Das Risiko liegt beim Augenarzt,
der die Beurteilung vornimmt.“

next
sight

Optometrie

Gesundheitsberufegesetz GesBG 1. Februar 2020

Im Interesse der öffentlichen Gesundheit soll mit dem Gesundheitsberufegesetz die Qualität in denjenigen Gesundheitsberufen, die mehrheitlich an Fachhochschulen vermittelt werden, gefördert werden. Dazu werden gesamtschweizerisch einheitliche Anforderungen an die Ausbildung und Berufsausübung festgelegt.

Optometrie

- „Optometristinnen überprüfen die Augengesundheit, analysieren Sehprobleme und bestimmen die Korrekturwerte“
 - Anamnese
 - Refraktion, inklusive binokularem Status
 - Funktionstest's: Neurologie und Motorik
 - Inspektion des vorderen Augenabschnittes
 - Inspektion des hinteren Augenabschnittes
 - Tonometrie
 - Perimetrie

Optometrie

- Wozu der ganze Aufwand??

Businessmodell

- 2003 aus dem Kontaktlinsenstudio . . .
 - 1 Optometrist,
1 dipl. Augenoptiker,
2 Assistentinnen
 - Jahresumsatz 835'000
 - Nettorendite 3.5%

kontaktlinsenstudio bärtschi

freedom to see.

eyeness[®]
wellness für ihre augen

Businessmodell

... wird die Optometrie Praxis

- 6 OptometristInnen,
5 AssistentInnen,
2 Backoffice
- Jahresumsatz 2'130'000
 - 40% Umsatz durch
Dienstleistung
- Ertragssteigerung +152%
oder **10.1%** pro Jahr
- Nettorendite **6.1%**

Optom 1-3

Anlernen
& Labor

WC

Küche & Sitzung/Pause ->

Personal
Garderoben & WC ->

Optik 2

Office

IT

Optom 4

Back
Office

wellness für ihre augen

Businessmodell

[Portrait](#) [Dienstleistungen](#) [Produkte](#) [News](#) [Kontakt](#) [DE/EN](#)

Unsere Preise

Wir glauben an faire Preise. Bei uns behalten Sie den Überblick und kaufen nicht die Katze im Sack. Unsere Dienstleistungen werden getrennt von den Produkten aufgelistet – transparent und ehrlich!

Wir offerieren immer mehrere unterschiedliche Lösungsansätze. Unsere Materialpreise werden laufend aktualisiert und sind mit dem Schweizer Internethandel vergleichbar.

Businessmodell

Unsere Dienstleistungen

Erstkonsultation

Kontaktlinsen

Optometrie

Sehen

Philosophie

Ihr Sehen bedingt ein komplexes Zusammenspiel von Optik, muskulärer Koordination und nervlicher Verarbeitung. Deshalb erheben wir bei der Erstkonsultation Ihren kompletten visuellen und optometrischen Status. Diese Analyse dient einerseits als Grundlage unserer jetzigen Beratung, andererseits auch zur Beurteilung von Veränderungen in der Zukunft, was ohne Grundlagenmessung nicht möglich ist. Die Analyse Ihrer Situation wird 60 – 90 Minuten in Anspruch nehmen.

Anmeldung und weitere Informationen [>](#)

Erstkonsultation _____ 250

KOMPLETTER VISUELLER STATUS 75

Kompletter visueller Status mittels Funktionstests, subjektiver Brillenglasbestimmung und digitaler Biomikroskopie des vorderen Augenabschnittes und der Augenmedien

KOMPLETTER OPTOMETRISCHER STATUS 175

Kompletter optometrischer Status inklusive Topographie, Pachymetrie, Biometrie (Augenlänge), Rebound-Tonometrie (Augendruck), Ophthalmoskopie, SLO Panorama Netzhautfotographie, Kohärenz-Tomographie (OCT) sowie Octopus-Perimetrie (Gesichtsfeld)

Businessmodell

OPTOMETRISCHE DIENSTLEISTUNGEN

Vorderer Augenabschnitt (pro Stunde) ____ 225

Untersuchung des vorderen Augenabschnittes mittels digitaler Mikroskopie

Trockenes Auge _____ 225

Analyse des trockenen Auges mittels Infrarot Meibographie, digitaler Tränenfilmanalyse und Mikroskopie

Hinterer Augenabschnitt _____ 175

Inklusive Ophthalmoskopie, Rebound-Tonometrie (Augendruck), SLO Panorama Fundusfotographie, Tomographie (OCT), Topographie, Pachymetrie sowie Octopus-Perimetrie

Voruntersuchung Chirurgie _____ 350

Komplett Evaluation zur Vorbereitung einer refraktiven Chirurgie (LASIK; PRK; CATARACT)

Fachbericht und Überweisung _____ 45

Detaillierter Bericht oder Überweisung an Fachpersonen

KINDER OPTOMETRIE

Kleinkinder (Alter 6 Monate bis 2 Jahre) ____ 45

Entwicklungsgerechte Evaluation des visuellen Status und des Entwicklungsfortschrittes

Kinder im Vorschulalter _____ 75

Kindgerechte Evaluation des visuellen Systems inklusive digitaler Biomikroskopie

Kinder bis 16 Jahren _____ 195

Eine Erstkonsultation von Kindern bis 16 Jahren beinhaltet folgende Leistungen:

VISUELLER STATUS _____ 75

Inklusive Funktionstests, subjektive Brillenglasbestimmung, digitale Biomikroskopie des vorderen Augenabschnittes und der Augenmedien

OPTOMETRISCHER STATUS _____ 120

Inklusive Topographie, Pachymetrie, Biometrie (Augenlänge), SLO Panorama Netzhautfotographie

Businessmodell

Jahresumsätze

Integration in die Praxis

Integration in die Praxis

- Ist mein Wissen auf dem notwendigen Stand?
 - Wo kann ich mehr lernen? (2-3 Tagungen pro Jahr)
 - Sind meine Mitarbeiter «up to date»? Wie stelle ich dies sicher? (interne und externe Schulungen sind ein MUST)
 - Wie kommuniziert das Team mit den Patienten?
- Regelmässiges, geplantes Update oder Upgrade der Infrastruktur und des Wissens gehört in jede Jahresplanung

Integration in die Praxis

Bsp. Eyeness AG 2017

- ✓ 26 Fachtagungen
- ✓ > 30 interne
Mitarbeitermeetings
- ✓ Neue Digitalkameras
- ✓ Umgestaltung Praxis
- ✓ Teilnahme an 4 Studien
- ✓ 14 Vorträge
- ✓ Publikationen/Interviews

Jahresplanung 2017			
	Termin	Anlass	Wer
Januar	12. - 14.	OTO goes Zurich	MiB
	15. -16.	Interiens, Bern	SB, MF
Februar			
März	8. -10.	Swiss Academy of Ophthalmology, Luzern	MiB
	11. -13.	Umbria Club Meeting, Ingolstadt	MW, MF
	19. - 20.	SBAO Tagung, Bern	MF, JK
April	3. -4.	Alcon AECE Seminar, Rotkreuz	MF
	4	J&J Symposium ESI Norderstedt	MW, MiB
Mai	15	vonhoff workshop Dry Eye, Schlieren	MW
	15	Alcon AECE Seminar, Rotkreuz	MF
Juni	9. -11.	BCLA Liverpool	SB, MF
	20.-21.	Cooper misight Einführung, Frankfurt	MiB
	21. - 23.	Contamac Symposium, Essex, UK	MW
Juli	28. - 30.	Masterthesispräsentation Benediktbeurn	MF
August		Interiens	SB
September	30. - 1.	SOG-SSO, Davos	MiB
	17. - 18.	SBAO Tagung Zürich	JK
	20	MedEd Symposium, Bern	MiB
	23. -25.	Umbria Club Meeting, Pfäffikon ZH	JK
Oktober	6. -7.	VDCO Optometrie, Hamburg sichtkontakt.de	(JK)
	8	Tag der Optometrie, Hamburg	(JK)
	11.-14.	AAO Chicago	MW
	16	Alcon AECE Seminar, Rotkreuz	MF
November	6	SBAO Workshop Olten	MiB
	17	Gipfelblicke, GOBAG, Bern	MiB
	18	Myopiekontrolle, Klagenfurt/Österreich	MiB
	20	Advanced OCT, Roggwil/Arbon	MiB
Dezember			
	<i>kursiv = Teilnehmer</i>	fett = Referent	noch vakant

Businessmodell

1. Januar bis 30. Juni 2021:

5556 verrechnete Dienstleistungen, 40% Anteil am Umsatz

Integration in die Praxis

Warum Optometrie?

- Business – Klar, aber nicht nur!
- Profession und Ethik
 - Optometrie als reines Business steht auf dünnem Eis und kann schnell als unethische Geldmacherei empfunden werden (z.T. Ophthalmologie)
 - Dienstleistung nur um ihrer selbstwillen zu Verkaufen ist kurzsichtig und gar gefährlich
 - Optometrie als echte Fürsorge für die Patienten, wird sich immer auch finanziell lohnen

Funduskamera SLO

Grundlagen SLO

- Scanning Laser Ophthalmoscopy SLO nutzt 2 Laser mit unterschiedlicher Wellenlänge

Grundlagen SLO

- Scanning Laser Ophthalmoscopy SLO wird zur Tiefenanalyse genutzt

Grundlagen SLO

„Rot frei“ Green

„IR“ Red

Grundlagen Autofluoreszenz

- (Eigen)Fluoreszenz aktiviert durch Blaulicht (Laser)
- Zeigt metabolische (Lipofuszin) und pathogene Veränderungen des retinalen Pigmentepithels (RPE)
- Unterscheidung «totes» RPE von hyperaktivem, entzündlichem RPE

Aktive Vitelliform Makula Dystrophie
(Morbus Best)

Inaktives abgestorbenes Gewebe einer
retinalen Narbe

Grundlagen OCT

Spectral Domain OCT
iVue von Optovue

Grundlagen OCT

OCT technology

FD-OCT has a higher acquisition speed and better resolution. It has essentially replaced TD-OCT.

**Time-Domain OCT
(TD-OCT)**

**Fourier-Domain OCT
(FD-OCT)**

**Spectral-Domain OCT
(SD-OCT)**

**Swept-Source OCT
(SS-OCT)**

SD-OCT is currently the standard for ophthalmic instruments and the most used OCT in ophthalmology clinics.

SS-OCT is a newer technology that has a higher imaging speed and allows for better visualization of deeper structures. It uses an invisible light source, which is less distracting for patients compared to the visible light used with SD-OCT.

Anterior Scans

- Pachymetrie

- Scan der gesamten Corneadicke (kein Modul zum umrechnen des IOD)
- Stroma Irregularitäten direkt ersichtlich
- Messung unabhängig des Tränenfilms
- Change Analyse und OU Report (insbesondere bei Ektasien wichtig!)
- keine Topographie!

Anterior Scans

Right / OD

Cornea Pachymetry OU Report

Left / C

Scan 28-01-2013 02:39:00

Good 57 Scan Quality Index Good 55

Scan 28-01-2013 02:39

Pachymetry Assessment

Superior - Inferior Comparison within 5mm zone

SN-IT(2-5mm):	<input type="text" value="22"/>	S-I(2-5mm):	<input type="text" value="11"/>
Min:	<input type="text" value="456"/>	Location Y:	<input type="text" value="281"/>
Min-Median:	<input type="text" value="-40"/>	Min-Max:	<input type="text" value="-87"/>

Min thickness (x, y) -0.059mm, 0.281mm shown as *

Pachymetry Assessment

Superior - Inferior Comparison within 5mm zone

SN-IT(2-5mm):	<input type="text" value="11"/>	S-I(2-5mm):	<input type="text" value="26"/>
Min:	<input type="text" value="447"/>	Location Y:	<input type="text" value="-305"/>
Min-Median:	<input type="text" value="-43"/>	Min-Max:	<input type="text" value="98"/>

Min thickness (x, y) 0.035mm, -0.305mm shown as *

Anterior Scans

- LASIK (Flap Interface)

Anterior Scans

- Cornea Pachymetrie Change Analyse

Previous Scan 15-12-2012 06:26:29

Scan Quality Index **Good 39**

Pachymetry Assessment
Superior - Inferior Comparison within 5mm zone

SN-I(2-5mm):	136	S-I(2-5mm):	-525
Min:	183	Location Y:	2367
Min-Median:	-783	Min-Max:	-1138

Min thickness (x, y) 0.029mm, 2.367mm shown as *

Show Original

Pachymetry Assessment
Superior - Inferior Comparison within 5mm zone

SN-I(2-5mm):	-25	S-I(2-5mm):	-5
Min:	292	Location Y:	439
Min-Median:	-17	Min-Max:	-42

Min thickness (x, y) -1.178mm, 0.439mm shown as *

Recent Scan 02-02-2013 02:45:12

Scan Quality Index **Good 53**

Anterior Scans

- Kammerwinkel und Iris

Anterior Scans - Linsen

- Zentrale Auflage der Kontaktlinse
 - Sklerallinsen müssen die gesamte Cornea überbrücken

Anterior Scans - Vaulting

Anterior Scans - Linsen

- Peripheres Sitzverhalten der Kontaktlinse
 - Limbal – Skleralzonenübergang ersichtlich, betreffend Fluss und Touch
 - Skleralzone Auflagewinkel exakt bestimmbar

Anterior Scans - Linsen

- Anpasshilfe auch bei Hydros

Posterior Scans

- OCT Aufnahme der Retina
 - Scan des gesamten Querschnittes der Retina, Makula/Fovea und teilweise der Aderhaut
 - In-vivo Betrachtung
 - Differenzierung der Schichten
 - Retina Irregularitäten direkt ersichtlich
 - Change Analyse und OU Report (bei progressiv pathogenen Prozessen wie Glaukom, AMD, Ablatio/Amotio usw. wichtig!)
 - Dokumentation zur Überweisung

Retina Family

Der Projektmanager
Ganglionzelle

Die Eule und die Lerche
Bipolare Zelle

Der Jogi
Retinale Pigmentepithelzelle

Der Dolmetscher
Horizontalzelle

Der Bergmann
Stäbchen

Der Hippie
Zapfen

Bildquelle: www.roche.com

Posterior Scans - Makula

OD

Posterior Scans

Quelle: raxworthyopticians.co.uk

Posterior Scans - Makula

Posterior Scans - Makula

Retina Map

Scan Quality Index **Good 49**

Left / OS

- Thickness**
- Full Retinal
 - Inner Retinal
 - Outer Retinal
- Significance**
- Full Retinal
 - RPE

Posterior Scans GCC/NFL

Rechts / OD

Glaukom Nervenfasern ONH/GCC Symmetriebericht

Datum: 2017-08-19

Zeit 11:43:15

Qual. 49

Scanqualitäts-Index

Qual. 52

Zeit 11:43:41

NDB Referenz

Sehnerven Kopf Karte

Parameter RNFL-Zusammenf.

RNFL Analyse (µm)	OD	OS	Unterschied beider Augen
µ RNFL Dicke	101	86	15
µ RNFL superior	95	84	11
µ RNFL inferior	108	90	18
Intra Augen Diff. (S-I)	-11	-4	N/A
ONH Analyse	OD	OS	Unterschied beider Augen
C/D Fläche	0.18	0.33	-0.15
V. C/D	0.25	0.33	-0.20
H. C/D	0.63	0.63	-0.01
Randkammerfläche (mm ²)	1.23	1.30	-0.30
Papillenfläche (mm ²)	1.55	2.35	-0.80
Ekzentrationsvolumen (mm ³)	0.013	0.019	-0.042

Links / OS

TSNIT Normdatenref.

NDB Referenz

Parameter GCC-Zusammenf.

Durchschn. GCC (µm)	OD	OS	Unterschied beider Augen
Gesamt	96	89	7
Superior	99	90	3
Inferior	96	86	10
Intra Augen Diff. (S-I)	0	7	N/A
FLV (%)	0.432	0.767	-0.345
GLV (%)	1.201	0.233	-3.054

Zeit 11:47:19

Qual. 54

Scanqualitäts-Index

Qual. 48

Zeit 11:45:18

Ausdruck

Änderungsanalyse

OU Bericht

optovue

SS re augn

Posterior Scans Verlauf

Nervenfaser ONH/GCC Änderungsanalyse

Rechts / OD

GCC Dickenkarte

Durchschn. GCC (µm)	03/19/13	08/10/18	Veränderung
Gesamt	N/A	86	N/A
Superior	N/A	89	N/A
Inferior	N/A	89	N/A
FLV (%)	N/A	1.12%	N/A
GLV (%)	N/A	8.35%	N/A

RNFL-Parameter	03/19/13	08/10/18	Veränderung
Durchschn. RNFL	96	84	-2
Sup. RNFL	99	84	-5
Inf. RNFL	93	85	1
H. C/D	0.84	0.96	0.02
V. C/D	0.70	0.72	0.02
Randseifenfläche	0.90	0.88	-0.02

RNFL Analyse

µm RNFL Veränderungsrate = -0.31 µm/Yr 95% CI [-1.01, 0.40] p = 0.20

µm GCC Veränderungsrate = 0.13 µm/Yr 95% CI [-2.77, 3.02] p = 0.68

Swept-Source OCT & Angiographie

Screening OCT

- Anterior
 - Sklerallinsen Anpassungen und Nachbetreuungen wurden durch das anterior OCT massiv verbessert
- Posterior
 - Auflösung, Bildqualität und Software sind fürs Screening ausgelegt – für uns absolut genügend!
 - Kombination mit einer Funduskamera ist zwingend (Bildqualität Netzhautbild)
 - GCC/NFL Analyse und Verlauf bieten extrem hilfreiche Informationen
 - Visus Veränderungen sind mit einem Makula Scan erklärbar

Screening OCT

- Ein OCT ist ein integraler Bestandteil einer modernen Optometriepraxis
- Ein OCT eröffnet den Blickwinkel in Strukturen und erklärt Symptome welche uns vorher oft verborgen blieben
 - Ergänzt die Befunde welche durch andere optometrische Methoden zuvor erfasst wurden

Kommunikation

Kommunikation Px

- Ein Auge gilt so lange als „verdächtig“ bis es sich als **„der Norm entsprechend“** erwiesen hat
 - Strukturiertes Vorgehen nach optometrischen Grundsätzen und keine „Patho-Jagd“
 - Patient über **Kosten** informieren und **separat abrechnen**
- Patient über **Untersuchungsschritte vorinformieren** und **Ergebnisse** mit dem Patienten **besprechen**
- Unsere Untersuchung **ergänzt den diagnostischen Augenarztbesuch, ersetzt ihn aber therapeutisch nicht**

Zuweisungen

- **Auffälliges** den zuständigen Stellen **schriftlich zuweisen** (Augenarzt, Hausarzt, Neurologie, Diabetologie, Rheumatologie usw.)
 - Freundlicher, strukturierter und gut **dokumentierter Bericht**
 - Nur **relevante** Dokumente einfügen. Achtung vor Datenflut!
 - **Patienten informieren** als Cc
- **Auffälliges benennen** ohne zu diagnostizieren (z.B. Visus 0.63, Bindehautrötung Grad 3, Makula Ödem etc.)

Zuweisungen

Obige Patientin wurde mir vom Kontaktlinsenstudio Bärtschi zugewiesen. Nach Durchsicht des detaillierten Zuweisungsberichts habe ich die Patientin informiert, dass eine retinologische Beurteilung inklusive OCT und Fluoreszenzangiographie in der Augenklinik sinnvoll ist. Ich danke Dir oder den Kollegen vor Ort für ein Aufgebot und die Beurteilung.

Herzliche Grüsse

Dr. med. Alexander Meyenberg

Beilagen

Schreiben Kontaktlinsenstudio Bärtschi inkl. Ausdruck Pentacam, OCT

Kopie an

Herrn MS. Optom. FAAO Michael Wyss, Kontaktlinsenstudio Bärtschi, Hirschengraben 11, Postfach, 3011 Bern, mit bestem Dank für die Zuweisung und Bitte um Verständnis betreffend Weiterweisung in die retinologische Sprechstunde

PAUSE

Fälle aus unserer Praxis

Retina Pathologien

Aufbau Workshop

Beschreibung der Person und deren Symptome

Erste Ideen? Wo suchen?

Gemeinsame Analyse der Befunde

Pathophysiologischer Hintergrund

Lösungsfindung und weiteres Vorgehen

Fall 1

- Patientin Deborah, 55 Jahre, weiblich, Kaukasierin, Übersetzerin
- Anamnese
 - Will neue Brille, sonst alles OK
 - Brillen- und KL Trägerin (Myopie)
 - Letzte Kontrolle vor 5 Jahren (Optiker)
 - War früher einmal bei Augenarzt, sei gesund
 - Medikamentation: negativ

Untersuchung SOAP

- **Subjektiv**

- OS Sehen in allen Distanzen mit 5 Jahre alten Brille OK, OD aber nicht mehr ganz optimal für Ferne und Nähe, Medikamentation negativ

- **Objektiv**

- Refraktion OD -4.50 -0.25 22° Vacc 0.80/ OS -4.75 Vacc 1.00 // Addition +2.0 in 40cm Vacc 0.63 OD / Vacc OS 1.0
- Cover unauffällig Ferne und Exophorie Nähe (mit Addition)
- Pupillen PERRLA (-) APD, Motilität voll ohne Einschränkungen, NPC <10cm
- Anterior Segment unauffällig (Spaltlampe)

SLO Analyse

OCT Übersicht

Rechts / OD

Zeit 15:56:49

Qual. 70

Scanqualitäts-Index

Qual. 74

Zeit 15:57:05

Glaukom Nervenfasern ONH/GCC Symmetriebericht

Datum: 2015-05-15

NDB Referenz

Sehnervenkopf Karte

Parameter RNFL-Zusammenf.

RNFL Analyse (µm)	OD	OS	Unterschied beider Augen
µ RNFL Dicke	97	104	-7
µ RNFL superior	90	100	-10
µ RNFL inferior	90	100	-4
Intra Augen Diff. (S-I)	0	6	N/A
DMH Analyse	OD	OS	Unterschied beider Augen
C/D Fläche	0.37	0.28	0.11
V. C/D	0.31	0.42	0.10
H. C/D	0.76	0.80	0.10
Randsaumfläche (mm ²)	1.97	1.84	-0.57
Papillenfläche (mm ²)	1.89	2.20	-0.51
Ekavationsvolumen (mm ³)	0.948	0.938	0.030

Links / OS

Sehnervenkopf Karte

NDB Referenz

TSNIT Normdatenref.

Parameter GCC-Zusammenf.

Durchschn. GCC (µm)	OD	OS	Unterschied beider Augen
Gesamt	109	102	6
Superior	108	96	9
Inferior	110	107	3
Intra Augen Diff. (S-I)	-2	-8	N/A
FLV (%)	0.086	0.108	-6.754
GLV (%)	0.381	0.256	-7.195

Zeit 15:58:40

Qual. 86

Scanqualitäts-Index

Qual. 86

Zeit 15:58:34

Abdruck

OU Bericht

OCT Makula OD

Analyse und Plan

- Glaskörperabhebung mit Traktion der Makula und daraus resultierendem Schichtforamen bzw Lakunae
- Überweisung und augenärztliche Untersuchung indiziert
 - Beobachten, da noch guter Visus vorhanden

Fall 2

- Patientin Liliane, 43, Kaukasierin, Kauffrau
- Anamnese
 - schleichender Visusabfall OD (0.80) in den letzten Jahren
 - Trägt seit 10 Jahren Monatslinsen ohne grössere Probleme
 - War noch nie beim Augenarzt
 - Medikamentation negativ
- Objektiv
 - keine Erklärung Refraktiv, Funktionsteste OK, anterior Segment unauffällig (Spaltlampe), Topographisch und indirekte Ophthalmoskopie

SLO – auffällig?

OCT OD- Makula

- OCT Makula Scan – und alles macht Sinn

SLO Scans - Makula

- Analyse im SLO zeigt das Foramen auch

Analyse und Plan

- Analyse
 - Makulaforamen
- Überweisung und augenärztliche Untersuchung indiziert
 - Beobachten, da noch guter Visus vorhanden und keine Traktion zu erkennen

Fall 3

- Patientin Elisabeth, 63, Kaukasierin, Geschäftsführerin Rotes Kreuz
- Anamnese
 - Routineuntersuchung der Kontaktlinsen
 - Keratokonus OU Grad 3 (quadrantenspezifische RGP)
 - 1x jährlich in ophthalmologischer Kontrolle, alles in Ordnung
 - Medikamentation negativ

Untersuchung SOAP

- **Subjektiv**

- schleichender Visusabfall OD in den letzten Monaten, hat Angst vor Keratokonus Progression

- **Objektiv**

- Über-Refraktion OD plano Vacc 0.63 / OS -2.25 Vacc 1.00 // Addition +2.25 Monovision OS in 40cm Vacc 1.00
- Funktionsteste unauffällig
- Anterior Segment inklusive Topographie und Pachimetrie ohne Progression

SLO Scans

OCT Makula Scans

OD

OS

Analyse und Plan

- Analyse

- Visus nicht nur durch Keratokonus reduziert, keine Progression
- Beginnende trockene Makula Degeneration

- Überweisung und augenärztliche Untersuchung indiziert

- Beobachten, da noch relativ guter Visus vorhanden und keine Therapiemöglichkeiten bei trockener AMD

5 Jahre später . . .

5 Jahre später . . .

Fall 4

- Patientin Brigitte, 33, Kaukasierin, Lehrerin
- Anamnese
 - Erstkonsultation und Kontrolle der bestehenden Monats-Kontaktlinsen
 - Medikamentation negativ
- Objektiv
 - Keine Auffälligkeiten Refraktiv, Funktionsteste OK, anterior Segment unauffällig (Spaltlampe)

SLO Scan OD – auffällig?

OCT Makula Scan OD

SLO Scans

SLO normal

Infrarot Scan

Analyse und Plan

- Analyse
 - Retinoschisis bei Grubenpapille
- Überweisung und augenärztliche Untersuchung indiziert
 - Direkte Weiterweisung an die Retina Spechstunde
 - Engmaschige Kontrollen und ev Vitrektomie bei Progression

Fall 5

- Patientin Nicole, 31, Kaukasierin, HR Verantwortliche
- Anamnese
 - Kontrolle der bestehenden Monats-Kontaktlinsen
 - Hochgradige Myopie -10Dpt
 - Medikamentation: Pille
 - Seit 1 Woche Gesichtsfeldeinschränkung links unten, keine Blitze wahrgenommen, Floaters unverändert
- Objektiv
 - Keine Auffälligkeiten Refraktiv, Funktionsteste OK, anterior Segment unauffällig (Spaltlampe)

SLO Aufnahmen

OCT Analyse

Rechts / OD

Glaukom Nervenfasern ONH/GCC Symmetriebericht

Datum: 2018-06-22

Zeit 11:17:35

Qualitätsindex **Gut: 84** Scanqualitätsindex **Gut: 70**

Zeit 11:17:47

NDB Referenz

Sehnervenkopf Karte

Parameter RNFL-Zusammenf.

RNFL Analyse (µm)	OD	OS	Unterschied beider Augen
µ RNFL Dicke	83	87	0
µ RNFL superior	84	80	-4
µ RNFL inferior	80	78	2
Intra Augen Diff. (S-I)	-17	-11	N/A

ONH Analyse	OD	OS	Unterschied beider Augen
C/D Fläche	0.31	0.30	0.01
V. C/D	0.37	0.29	-0.07
H. C/D	0.43	0.28	0.15
Randseumfläche (mm²)	7.08	7.40	-0.37
Papillenfläche (mm²)	1.27	1.67	-0.40
Exkavationsvolumen (mm³)	0.887	0.905	0.002

TSNIT Normdatenref.

Invertierte Normal
Grenzwertig
Anomalie Verdacht

Parameter GCC-Zusammenf.

Durchschn. GCC (µm)	OD	OS	Unterschied beider Augen
Gesamt	86	73	-133
Superior	85	162	-67
Inferior	104	202	-198
Intra Augen Diff. (S-I)	-9	-140	N/A
FLV (%)	0.419	1.403	-1.054
GLV (%)	0.391	1.473	-0.882

Links / OS

Sehnervenkopf Karte

NDB Referenz

Zeit 11:19:14

Qualitätsindex **Gut: 84** Scanqualitätsindex **Gut: 52**

Zeit 11:19:01

Ausdruck

OU Bericht

Rechts / OD

06/22/2018 11:17:23

Retina Karte Symm.bericht

Scanqualitäts-Index **Gut 68**

6.00x6.00 Scan Größe(mm)

Auto-Zoom

250µm

Dicke

gesamte Retina

innere Retina

äußere Retina

NDB Referenz

Gesamte Retina

Links / OS

06/22/2018 11:18:51

Scanqualitäts-Index **Gut 54**

Ausdruck

Analyse und Plan

- Analyse
 - Grossflächige Amotio Retinae OS
- Überweisung und augenärztliche Untersuchung indiziert
 - Direkte Überweisung an die Retina Sprechstunde
 - Operation (Vitrektomie und Cerclage) und Hospitation direkt nach Ankunft in Klinik

2 Jahre später . . .

2 Jahre später . . .

Fall 6

- Patientin Ursula, 52, Kaukasierin, Hausfrau
- Anamnese
 - Trägt Tages-Kontaktlinsen bei Hochgradige Myopie -8Dpt
 - Hypertonie bekannt aber nicht therapiert
 - Medikamentation: negativ
 - Seit gestern markante Visusabnahme OS, keine Blitze wahrgenommen, aber Floaters stark zugenommen
- Objektiv
 - Keine Auffälligkeiten Refraktiv, Funktionsteste OK, anterior Segment unauffällig (Spaltlampe)

SLO Aufnahmen

Retina Karte Symm.bericht

Rechts / OD

04/17/2018 09:31:42

Scanqualitäts-Index **Gut 61**

6.00x6.00 Scan Größe(mm)

Auto-Zoom

250µm

Dicke

gesamte Retina

innere Retina

äußere Retina

NDB Referenz

Gesamte Retina

Links / OS

04/17/2018 09:32:47

Scanqualitäts-Index **Gut 57**

Ausdruck

Änderungsanalyse

Analyse und Plan

- Analyse
 - Retina Venenastverschluss
- Überweisung und augenärztliche Untersuchung indiziert
 - Direkte Überweisung an die Retina Sprechstunde
 - Hypertonie Therapie

Fall 7

- Patient Patrick, 42, Kaukasier, Manager
- Anamnese
 - Myopie -3.0Dpt mittels Orthokeratologie korrigiert
 - 6 Monatskontrolle, keine Beschwerden, Visus schwankt in den letzten Monaten
 - Medikamentation: negativ (Stress im Job)
- Objektiv
 - Keine Auffälligkeiten Refraktiv, Funktionsteste OK, anterior Segment unauffällig (Spaltlampe)

SLO Aufnahmen

OCT Analyse

Rechts / OD

Glukom Nervenfasern ONH/GCC Symmetriebericht

Datum: 2018-09-18

Zeit: 12:16:06

Qual: 86

Scenqualitäts-Index

Qual: 73

Zeit: 12:16:48

NDB Referenz

Sehnervenkopf Karte

Parameter RNFL-Zusammenf.

RNFL Analyse (µm)	OD	OS	Unterschied beider Augen
µ RNFL Dicke	101	100	1
µ RNFL superior	119	106	2
µ RNFL inferior	92	92	0
Intra Augen Diff. (S-I)	18	16	N/A

ONH Analyse	OD	OS	Unterschied beider Augen
C/D Fläche	0,26	0,29	0,02
V. C/D	0,44	0,40	0,04
H. C/D	0,51	0,48	0,02
Randsaumfläche (mm ²)	1,77	1,54	0,25
Papillenfläche (mm ²)	2,26	1,91	0,35
Exkavationsvolumen (mm ³)	0,076	0,071	0,005

TSNIT Normdatenref.

Links / OS

Sehnervenkopf Karte

NDB Referenz

Intensität: Normal
Grenzwertig
Erheblich reduziert

Parameter GCC-Zusammenf.

Durchschn. GCC (µm)	OD	OS	Unterschied beider Augen
Gesamt	96	96	0
Superior	96	97	-1
Inferior	96	96	0
Intra Augen Diff. (S-I)	0	1	N/A
FLV (%)	0,000	0,241	-0,241
GLV (%)	0,000	0,000	0,000

Zeit: 12:17:31

Qual: 71

Scenqualitäts-Index

Qual: 87

Zeit: 12:17:19

OCT Makula Scans

Rechts / OD

09/18/2018 12:15:56

Retina Karte Symm.bericht

Scanqualitäts-Index **Qual 64**

6.00x6.00 Scan Größe(mm)

Auto-Zoom

250µm

Dicke

gesamte Retina

innere Retina

äußere Retina

NDB Referenz

Gesamte Retina

Links / OS

09/18/2018 12:17:11

Scanqualitäts-Index

Qual 67

Analyse und Plan

- Analyse
 - Makula Ödem OU (Retinopathia Centralis Serosa ak. Managerkrankheit)
 - OD Inferior leicht verdünnte NFL
- Keine Überweisung oder augenärztliche Untersuchung indiziert
 - Jährliche optometrische Kontrollen

Fall 8

- Patient Beat, 48, Kaukasier, Postbeamter
- Anamnese
 - 6 Monats-Kontrolle der bestehenden Multifokal-Kontaktlinsen und zusätzlich Optometrie Check up
 - Medikamentation negativ
- Objektiv
 - Keine Auffälligkeiten Refraktiv (Ferne und Nähe), Funktionsteste OK, anterior Segment (Spaltlampe) unauffällig

SLO Scans

Zeit 10:15:23

Gut 71 Scanqualitäts-Index Gut 64

Zeit 10:15:31

NDB Referenz

Sehnervenkopf Karte

Parameter RNFL-Zusammenf.

RNFL Analyse (µm)	OD	OS	Unterschied beider Augen
Ø RNFL Dicke	84	82	2
Ø RNFL superior	84	85	-1
Ø RNFL inferior	83	79	4
Intra Augen Diff. (S-I)	1	6	N/A

ONH Analyse	OD	OS	Unterschied beider Augen
C/D Fläche	0.58	0.56	0.02
V. C/D	0.72	0.71	0.01
H. C/D	0.86	0.86	0.00
Randsaumfläche (mm ²)	0.88	0.86	0.02
Papillenfläche (mm ²)	2.11	1.95	0.16
Exkavationsvolumen (mm ³)	0.530	0.432	0.098

TSNIT Normdatenref.

Sehnervenkopf Karte

NDB Referenz

Parameter GCC-Zusammenf.

Durchschn. GCC (µm)	OD	OS	Unterschied beider Augen
Gesamt	88	88	0
Superior	88	88	0
Inferior	88	88	0
Intra Augen Diff. (S-I)	0	0	N/A
FLV (%)	1.120	1.558	-0.438
GLV (%)	8.350	7.421	0.929

Zeit 10:16:10

Gut 64 Scanqualitäts-Index Gut 70

Zeit 10:16:01

GCC Dickenkarte

Durchschn. GCC (µm)	03/19/13	08/10/18	Veränderung
Gesamt	N/A	88	N/A
Superior	N/A	88	N/A
Inferior	N/A	88	N/A
FLV (%)	N/A	1.120	N/A
GLV (%)	N/A	8.350	N/A

RNFL-Parameter	03/19/13	08/10/18	Veränderung
Durchschn. RNFL	86	84	-2
Sup. RNFL	89	84	-5
Inf. RNFL	82	83	1
H. C/D	0.84	0.86	0.02
V. C/D	0.70	0.72	0.02
Randsaumfläche	0.90	0.88	-0.02

RNFL Analyse

GCC Dickenkarte

■ Innerhalb Normal
■ Grenzwertig
■ Außerhalb Normal

Durchschn. GCC (µm)	03/19/13	08/10/18	Veränderung
Gesamt	N/A	86	N/A
Superior	N/A	88	N/A
Inferior	N/A	88	N/A
FLV (%)	N/A	1.558	N/A
GLV (%)	N/A	7.421	N/A

RNFL-Parameter	03/19/13	08/10/18	Veränderung
Durchschn. RNFL	86	82	-4
Sup. RNFL	88	85	-3
Inf. RNFL	83	79	-4
H. C/D	0.89	0.86	-0.03
V. C/D	0.68	0.71	0.03
Randsaumfläche	0.85	0.86	0.01

RNFL Analyse

Analyse und Plan

- Analyse
 - Papille zeigt gewisse Tendenzen zu Glaukom auf
 - NFL und GCC Verlauf relativ stabil, keine nennenswerte Progression
- Jährliche optometrische Kontrollen des Status indiziert, keine Augenärztliche Überweisung

Fall 9

- Patient Nils, 17, Gymnasiast
- Anamnese
 - Routinekontrolle der weichen, torischen KL
 - Myopie -2.25 / -1.75
 - Keine subjektiven Beschwerden
 - Medikamentation: negativ
- Objektiv
 - Keine Auffälligkeiten Refraktiv (Ferne und Nähe), Funktionsteste OK, anterior Segment (Spaltlampe) unauffällig

SLO Scans

Ultra-Wide Field Optos

Ultra-Wide Field Optos (Red Channel)

Ultra-Wide Field Optos (Green)

Analyse und Plan

- Analyse

- Grossflächige white without pressure Zone OD
Temporal

- Foramen mit subretinaler Flüssigkeit in 9 Uhr OD

- Plan

- YAG Koag./Retinafixierung am nächsten morgen früh
durch Retinaspezialisten

Ultra-Wide Field Optos (11 Tage)

Fall 10

- Patientin Katharina, 57, Sachbearbeiterin
- Anamnese
 - Erstkonsultation zur KL Kontrolle, OD Visus schwankend und zunehmend Ermüdend
- Objektiv
 - Keine Auffälligkeiten Refraktiv (Ferne und Nähe), OD Vacc 0.8, Funktionsteste OK, anterior Segment (Spaltlampe) unauffällig

Ultra-Wide Field Optos

Ultra-Wide Field Optos

OCT Makula

Analyse und Plan

- Analyse
 - Epiretinale Membran (ERM) mit Traktion der Makula und Lacunae Bildung
 - Temporal grosse Atrophie Zonen, keine subretinale Flüssigkeit
- Überweisung nicht zwingend indiziert, aber für Status und späterem ERM Peeling empfohlen

Fall 11

- Patientin Barbara, 67, Pensioniert
- Anamnese
 - Hyperopie, Presbyopie
 - Okkuläre Hypertension (IOP 21 / 22), Pachimetrie 600micron OU
- Objektiv
 - Keine Auffälligkeiten Refraktiv (Ferne und Nähe), Funktionsteste OK, anterior Segment (Spaltlampe) unauffällig

Ultra-Wide Field SLO (OD)

Ultra-Wide Field SLO (OD)

OCT NFL / GCC (OS)

Links / OS

Nervenfaser ONH/GCC Änderungsanalyse

GCC Dickenkarte

Verfahrs-Parameter	04/03/14	05/14/20	Veränderung
Durchschn. GCC (µm)	95	84	-11
Gesamt	94	81	-13
Superior	95	81	-14
Inferior	95	81	-14
FLV (%)	0.709	0.399	4.660
GLV (%)	1.811	11.338	9.927

RNFL-Parameter	04/03/14	05/14/20	Veränderung
Durchschn. RNFL	108	95	-14
Sup. RNFL	107	107	0
Inf. RNFL	111	84	-27
H. C/D	0.88	0.64	-0.24
V. C/D	0.48	0.62	0.14
Randsaumfläche	1.44	1.35	-0.09

RNFL Analyse

Verlauf Perimetrie

Analyse und Plan

- Analyse

- Nervenfaserschicht Inferior verdünnt OU
- OS Blutung im Bereich der Papille
- NFL und Perimetrie zeigen klare Progression

- Plan

- Überweisung und augenärztliche Glaukom Therapie umgehend initiiert

Fall 12

- Patientin Christine, 58, Leiterin BWL
- Anamnese
 - Routinemässige KL Kontrolle
 - Hyperopie, Presbyopie
- **Objektiv**
 - Keine Auffälligkeiten Refraktiv (Ferne und Nähe), Funktionsteste OK, anterior Segment (Spaltlampe) unauffällig

OCT NFL/GCC

Rechts / OD

Nervenfaser ONH/GCC Symmetriebericht

Datum: 2020-06-18

Zeit: 14:14:00

Gut: 66

Scanqualitäts-Index

Gut: 64

Zeit: 14:14:22

NDB Referenz

Sehnervenkopf Karte

Parameter RNFL-Zusammenf.

RNFL Analyse (µm)	OD	OS	Unterschied beider ...
Ø RNFL Dicke	128	103	25
Ø RNFL superior	106	107	-1
Ø RNFL inferior	150	99	51
Intra Augen Diff. (S-I)	-44	8	N/A

ONH Analyse	OD	OS	Unterschied beider ...
C/D Fläche	0.18	0.34	-0.16
V. C/D	0.31	0.60	-0.29
H. C/D	0.57	0.58	-0.01
Randsaumfläche (mm²)	1.75	1.48	0.27
Papillenfläche (mm²)	2.13	2.26	-0.13
Exkavationsvolumen (mm³)	0.052	0.165	-0.113

Links / OS

NDB Referenz

TSNIT Normdatenref.

Innenhalb Norm
Grenzwertig
Außerhalb Norm

Parameter GCC-Zusammenf.

Durchschn. GCC (µm)	OD	OS	Unterschied beider ...
Gesamt	104	96	8
Superior	101	95	6
Inferior	108	97	11
Intra Augen Diff. (S-I)	-7	-2	N/A
FLV (%)	0.042	0.485	-0.443
GLV (%)	0.155	1.444	-1.289

Zeit: 14:16:41

Gut: 82

Scanqualitäts-Index

Gut: 66

Zeit: 14:16:19

Ausdruck

Symmetriebericht

OCT NFL

Nerve Fiber ONH

Scanqualitäts-Index: 100/100 Reproduzierbarkeit zeigen

Rechts / OD

RNFL Dicke an Durchmesser 3.45mm

RNFL Analyse		µm	ONH Analyse	
µ RNFL Dicke	121		Cup/Disc Ratio Fläche	0.19
µ RNFL superior	106		Cup/Disc V. Ratio	0.21
µ RNFL inferior	130		Cup/Disc H. Ratio	0.57
Superior - Inferior	-44		Randsaumfläche (mm ²)	1.70
			Papillenfläche (mm ²)	2.13
			Exkavationsvolumen (mm ³)	0.052

Nicht in der Trendanalyse enthu

Abdruck

OU Bericht

Bemerkung

OCT ONH 3-D

Ultra-Wide Field Optos

Ultra-Wide Field Optos (Red)

DOB: Mar 15, 1962
Jun 18, 2020 2:12
Image: 4

EyeNess AO Dem
OPTOS, DAYTONA FL US
Lateralität: R
Red: 50%
Green: 50%

Zoom: 8,19
Präsentation: Mehrere

1/1

Ultra-Wide Field Optos

Red

Green

Analyse und Plan

- Analyse
 - Venenastverschluss nah des Sehnervenkopfs auf 6 Uhr
 - Lokal begrenztes (Stauungs)Ödem des Sehnervenkopfs
 - flächige, flammenförmige Blutungen inferior bis weit in die Peripherie, Exsudate auf 6 Uhr
- Sofortige Überweisung an Augenklinik
 - Aspirin Cardio zur Blutverdünnung
 - Vertiefte Kardiovaskuläre Abklärung bei Hausarzt / Kardiologie

Fall 13

- Patientin Irene, 47, Pflegefachfrau
- Anamnese
 - Myopia media, Astigmatismus gering
 - Routinekontrolle, Sehschärfe schwankt, gel. störender Schatten
- Objektiv
 - Keine Auffälligkeiten Refraktiv (Ferne und Nähe), Funktionsteste OK, anterior Segment (Spaltlampe) unauffällig

OCT NFL/GCC

Rechts / OD

Zeit 16:39:23

Qual 48 Scanqualitäts-Index Qual 26

Zeit 16:39:39

Glaukom Nervenfasern ONH/GCC Symmetriebericht

Datum: 2020-06-02

NDB Referenz

Sehnervenkopf Karte

Parameter RNFL-Zusammenf.

RNFL Analyse (µm)	OD	OS	Unterschied beider Augen
µ RNFL Dicke	96	91	7
µ RNFL superior	94	95	-1
µ RNFL inferior	101	98	13
Intra Augen Diff. (S-I)	-7	7	N/A

ONH Analyse	OD	OS	Unterschied beider Augen
C/D Fläche	0.41	0.37	0.04
V. C/D	0.33	0.40	-0.06
H. C/D	0.76	0.63	0.13
Randsaumfläche (mm²)	0.98	1.40	-0.42
Papillenfläche (mm²)	1.67	2.22	-0.55
Exkavationsvolumen (mm³)	0.90	0.30	-0.62

TSNIT Normdatenref.

Parameter GCC-Zusammenf.

Durchschn. GCC (µm)	OD	OS	Unterschied beider Augen
Gesamt	91	97	-6
Superior	90	96	-7
Inferior	95	98	-5
Intra Augen Diff. (S-I)	-4	-2	N/A
FLV (%)	0.40	0.33	0.251
GLV (%)	0.36	0.47	1.917

Links / OS

Sehnervenkopf Karte

NDB Referenz

Zeit 16:41:15

Qual 42 Scanqualitäts-Index Qual 40

Zeit 16:40:58

Ausdruck

OU Bericht

OCT Makula

Ultra-Wide Field Optos

Ultra-Wide Field Optos (Green)

Ultra-Wide Field Optos (Red)

Ultra-Wide Field Optos

5 Minuten später

Analyse und Plan

- Analyse
 - Mouches volantes, temporär zentral stark störend
- Plan
 - Aufklärung über potentielle Herkunft
 - evt. später Laser-Vitreolyse ? (Ellex Nd:YAG Laser)

Diffuse Floater:

Diese wolkenartigen Floater sind die Folge natürlicher Alterung. Während diese Art von Floatern mit der Laser-Vitreolyse behandelt werden kann, sind oft mehrere Behandlungen für ein zufriedenstellendes Resultat notwendig.

Wolkenartige Floater

Alter. In den meisten Fällen haben jüngere Patienten (<45 Jahre) mikroskopisch kleine Floater nahe an der Netzhaut (1-2 mm Abstand). Die Behandlung mit dem Floater-Laser eignet sich meist nicht für diese Patientengruppe.

Fall 14

- Patientin Angela, 53, Sekretärin
- Anamnese
 - Myopie, Astigmatismus, Presbyopie
 - Diabetes unter Kontrolle laut Px, jährliche Retina Untersuchung und laufende Kontrollen in der Diabetologie
- Objektiv
 - Keine Auffälligkeiten Refraktiv (Ferne und Nähe), Funktionsteste OK, anterior Segment (Spaltlampe) unauffällig

Ultra-Wide Field Optos (Farbe)

Ultra-Wide Field Optos (Farbe)

DOB: Dez 3, 1967
Feb 20, 2020 4:44
Image: 1

Eyeness AG Bern
OPTOS, DAYTONAPLUS
Lateralität: R
Red: 40%
Green: 60%

Zoom: 2,62
Präsentation: Mehrere

1/1
↓

DOB: Dez 3, 1967
Feb 20, 2020 4:44
Image: 2

Eyeness AG Bern
OPTOS, DAYTONAPLUS
Lateralität: L
Red: 35%
Green: 65%

Zoom: 2,62
Präsentation: Mehrere

1/1
↓

Analyse und Plan

- Analyse

- IDD (Insulin Dependent Diabetes)
- Multiple Hämatome, Mikroaneurismen
- Snail Track OS

- Plan

- Zuweisung an Augenarzt und Diabetologie

Fall 15

- GH kaukasierin, weiblich, Alter 50
- Anamnese: Sehverlust
 - Macula Degeneration Dx mit 30
 - massive Abnahme VAcc OD>OS in den letzten Jahren, in der täglichen Arbeit als Physiotherapeutin (80%) handicappiert
- Objektiv
 - Keine Auffälligkeiten Refraktiv, aber VAcc 0.12 / 0.32
Funktionsteste OK, anterior Segment (Spaltlampe)
unauffällig

Ultra-Wide Field SLO (OD)

Ultra-Wide Field SLO (os)

Autofluoreszenz

OCT Makula

OCT NFL OU

Perimetrie

OS 19.10.2020 / 14:40

Untersuchungsparameter: G, TOP, Pulsar, Weiss/Weiss, Pulsar
Refraktion, Korrekturglas (S/C/A), Pupille: -, -, 4.6 mm

Falsch positive/negative: 0% (0/3), 0% (0/3)
Dauer, Fragen/Wiederholungen: 03:28, 69/0
Fixationskontrolle: Aus

OD 19.10.2020 / 14:36

Untersuchungsparameter: G, TOP, Pulsar, Weiss/Weiss, Pulsar
Refraktion, Korrekturglas (S/C/A), Pupille: -, -, 5.6 mm

Falsch positive/negative: 0% (0/3), 0% (0/3)
Dauer, Fragen/Wiederholungen: 03:20, 69/0
Fixationskontrolle: Aus (92%), Min. (8%)

Korrigierte Graustufe (CO)

Indizes

MD [src]:	10.9	(p < 5%)
sLV [src]:	7.0	(p < 5%)
DD [src]:	5.3	(p < 5%)
LD [src]:	7.7	(p < 5%)
MS [src]:	10.8

Stimulus: Weiss, Pulsar, Pulsar, 200 asb, 500 ms
Hintergrund: Weiss/100 asb

Graustufe (CO): Defekt [% von normal] 100 □ □ □ □ □ □ □ □ 0

Korrigierte Graustufe (CO)

Indizes

MD [src]:	12.5	(p < 5%)
sLV [src]:	7.5	(p < 5%)
DD [src]:	6.6	(p < 5%)
LD [src]:	8.1	(p < 5%)
MS [src]:	9.2

Stimulus: Weiss, Pulsar, Pulsar, 200 asb, 500 ms
Hintergrund: Weiss/100 asb

Graustufe (CO): Defekt [% von normal] 100 □ □ □ □ □ □ □ □ 0

Analyse und Plan

- Retina Läsionen sorgfältig analysiert:
 - Symmetrisches Erscheinungsbild, sehr ungewöhnlich bei einer klassischen Makuladegeneration
 - Keine Drusen!
 - Dx Stargardts Disease
- Plan
 - Zuweisung an Retinaspezilaist, IV Anmeldung und Low Vision Versorgung initiiert
 - Dx bestätigt durch Retinaspezialist

Fall 16

- Patient Valentin, 28 Jahre, Kaukasier, Geschäftsmann
- Anamnese
 - Erstkonsultation Post LASIK (SMILE) wegen schlechtem Visus
 - Medikamentation: negativ
- Objektiv
 - Vacc 0.4 / 0.63 // Funktionstests unauffällig
 - Spaltlampe zentral Haze und Faltungen OU

OCT Pachimetrie

Rechts / OD

Scan 07/21/2014 11:35:10

Pachymetry

Pachymetry Statistik innerhalb Zentrale 5 mm

SN-IT(2-5mm):	<input type="text" value="19"/>	S-I(2-5mm):	<input type="text" value="3"/>
Min:	<input type="text" value="508"/>	Ort Y:	<input type="text" value="-2197"/>
Min-Median:	<input type="text" value="-58"/>	Min-Max:	<input type="text" value="-88"/>

Min Dicke (x, y) 0.914mm, -2.197mm wird als * angezeigt

Cornea Symmetriebericht

Gut 44 Scanqualitäts-Index Gut 33

Links / OS

Scan 21/07/2014 11:37:20

Pachymetry

Pachymetry Statistik innerhalb Zentrale 5 mm

SN-IT(2-5mm):	<input type="text" value="69"/>	S-I(2-5mm):	<input type="text" value="124"/>
Min:	<input type="text" value="446"/>	Ort Y:	<input type="text" value="-1664"/>
Min-Median:	<input type="text" value="-106"/>	Min-Max:	<input type="text" value="-183"/>

Min Dicke (x, y) -0.041mm, -1.664mm wird als * angezeigt

OCT Anterior Segment

OD

OS

Analyse und Plan

- Analyse
 - Irreguläre Cornea nach refraktiver Chirurgie (SMILE)
- Anpassung Sklerallinsen OU zur optischen Rehabilitation
 - SMT bitorische Sklerallinse mit Durchmesser 16.50

OCT Analyse Sklerallinse

Vault Map

Scangualitäts-Index **Grü 28**

Rechts / OD

Clearance-Bewertung (Brechungsindex 1.43)

Clearance-Bewertung Statistik innerhalb Zentrale 5 mm

SN-IT(2-5mm):	-158	S-I(2-5mm):	-108
Min:	118	Ort Y:	1.717
Minimal-Mittelwert:	-101	Minimal-Maximal:	-195

Min Dicke (x, y) 1.664mm, 1.717mm wird als " angezeigt

OCT Analyse Sklerallinse

0°

180°

270°

360°

Fall 17

- Patientin Sara, 20 Jahre, Kaukasierin, Kauffrau
- Anamnese
 - Myopie OD -3.0 / OS -2.25 Vacc 1.00 OU
 - Leidet an Diabetes
 - Medikamentation: Insulin, Pille
 - Familien Hx: negativ
 - Kontaktlinsenträgerin Monatslinsen seit 2014
 - Jährliche Augenarzt Untersuchungen, keine Auffälligkeiten

Untersuchung SOAP

- **Subjektiv**

- leicht Dry Eye aber 15h Tragezeit, Sehen in allen Distanzen angenehm, Handling auf / absetzen ohne Probleme, Medikamentation unverändert

- **Objektiv**

- Refraktion unverändert OD -3.0 / OS -2.25 Vacc 1.00 OU
- Cover unauffällig Ferne und leichte Exophorie Nähe
- Pupillen PERRLA (-) APD
- Motilität voll ohne Einschränkungen
- NPC <10cm

OCT Anterior Segment

Analyse und Plan

- Analyse
 - OS Iris mit gräulicher Erhebung in 4-5Uhr, welche vom Ziliarkörper ausgehend scheint
- Überweisung und augenärztliche Untersuchung indiziert
 - Ziliarkörper Melanom ohne Metastasen

Zusammenfassung

- Nur ein komplettes Optometrie Screening mit standardisiertem, immer gleichen Vorgehen ist die Voraussetzung um Auffälligkeiten entdecken zu können
- Eine lückenlose, möglichst digitale Dokumentation und Überweisung ist eine unschätzbare Visitenkarte für die Zukunft

Zusammenfassung

«Optometrie ist weit mehr als Dienstleistungen zu verkaufen oder eine Erlebnisrefraktion anzubieten, es geht um die Gesundheit der Patienten . . .

. . .und manchmal auch um Leben und Tod!»

Hands-On Girls and Boys

wellness für ihre augen

www.eyeness.ch/news/downloads